

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM
FARMÁCIA.**

EDITAL Nº 013/2013- COREMU

**RESPOSTAS AOS RECURSOS DO
GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA
ESCRITA (OBJETIVA) PARA A SELEÇÃO
DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA O
ANO LETIVO DE 2014.**

Os Coordenadores dos Programas de Residência Farmacêutica, com Especialidade em Análises Clínicas e Especialidade em Farmácia Hospitalar, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das atribuições estatutárias e regimentais, considerando:

TORNA PÚBLICO:

As respostas dos recursos interpostos contra os gabaritos provisórios da **Prova Objetiva** para a seleção de candidatos ao Programa de Residência Farmacêutica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme segue em anexo ao Edital:

Publique-se e cumpra-se.

Cascavel, 06 de dezembro de 2013.

LIGIANE DE LOURDES DA SILVA
Coordenador da Residência Farmacêutica Especialidade Farmácia Hospitalar –
COREFAR – Farmácia Hospitalar

JACQUELINE PLEWKA
Coordenador da Residência Farmacêutica Especialidade Análises Clínicas –
COREFAR – Análises Clínicas

Anexo do Edital nº 013/2014-COREMU, de 06 de dezembro de 2013.

1. FARMÁCIA HOSPITALAR

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 08 | (X) Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: São objetivos da farmacovigilância, exceto: e) redução dos custos do hospital/serviços de saúde com o internamento de pacientes por reações adversas e promoção do uso racional de medicamentos. - a alternativa engloba sim um dos objetivos da farmacovigilância, tanto redução de custos como uso racional de medicamentos, portanto a questão não tem nenhuma alternativa correta (em desacordo com os objetivos da farmacovigilância). SUGIRO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR FALTA DE ALTERNATIVA CORRETA.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 08: Mantem-se a alternativa E – Justificativa: A Farmacovigilância é o trabalho de acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado. As suas ações são realizadas de forma compartilhada pelas vigilâncias sanitárias dos estados, municípios e pela ANVISA. Embora sejam formulados para prevenir, aliviar e curar enfermidades, os produtos farmacêuticos podem produzir efeitos indesejáveis, maléficos e danosos. Essa dualidade, às vezes trágica, é significativa para a saúde pública e torna a Farmacovigilância atividade indispensável à regulação sanitária em qualquer país. A Farmacovigilância protege as populações de danos causados por produtos comercializados, por meio da identificação precoce do risco e intervenção oportuna. A definição de Farmacovigilância é a ciência e atividades relativas a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos. (Sbrafh, 2009). Desta forma a alternativa E está incorreta, pois a Farmacovigilância não tem nenhuma relação com a redução de custos com medicamentos no hospital.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 08: Recurso não procede. Manter a alternativa E.</p> | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|--|---|---|----------------------------|
| 09 | <input type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | (X) Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: Sobre notificação voluntaria/espontânea é correto afirmar que: Conforme a organização Pan-Americana de Saúde, “Uma notificação de caso deve (no mínimo) conter informações sobre os elementos seguintes: 3. Medicamento(s) suspeito(s): nome (nome comercial ou nome dos componentes + fabricante), dose, via de administração, datas de início e suspensão, indicação para uso (com medicamentos específicos como, por exemplo, vacinas, o número do lote é importante) 4. Todos os outros medicamentos utilizados (até mesmo automedicação): nomes, doses, vias de administração, início e suspensões, datas.”</p> | | | |

d) afirma que não são necessárias informações como dose e indicação. A ALTERNATIVA ESTÁ INCORRETA.

e) Saber sobre a utilização do medicamento anterior é uma informação relevante para a avaliação de uma reação adversa pela farmacovigilância. ALTERNATIVA CORRETA. Link para conferencia: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca.pdf>. SUGIRO ALTERAÇÃO DO GABARITO DE (D) PARA (E)

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 09: Recurso procede. Alteração do gabarito para alternativa E.

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|---|---|---|---|
| 13 | <input type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input checked="" type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: Em relação aos Sistemas de distribuição de medicamentos:</p> <p>a) No sistema de Distribuição Coletiva, o estoque é centralizado por unidade assistencial. CORRETA</p> <p>- O sistema coletivo se caracteriza, principalmente, pelo fato de os medicamentos serem distribuídos por unidade de internação e/ou serviço a partir de uma solicitação de enfermagem, implicando a formação de vários estoques nas unidades assistenciais. Neste sistema, os medicamentos são liberados sem que o serviço de farmácia tenha as seguintes informações: para quem o medicamento esta sendo solicitado, porque esta sendo solicitado...</p> <p>d) No sistema de distribuição por dose unitária, a prescrição médica ou cópia é enviada a farmácia, onde são preparados a folha de dispensação e o perfil farmacoterapêutico do paciente. INCORRETA.</p> <p>- a “folha de dispensação” é a própria prescrição realizada pelo médico, o farmaceutico deve sim ter uma forma de controle do que foi dispensado porém não desta forma. O perfil farmacoterapêutico é traçado e determinado pelo médico, a função do farmacêutico é avaliar a terapêutica indicada para identificar possíveis erros e sugerir ao médico, o qual tem autonomia para alterar a prescrição. SUGIRO ALTERAÇÃO DO GABARITO DE (D) PARA (A).</p> | | | |
| RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 13: Recurso procede. Alteração do gabarito para alternativa A. | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|--|---|---|---|
| 15 | <input type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input checked="" type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: Manipulação de citotóxicos:</p> <p>a) são recomendações para a manipulação de citotóxicos. ALTERNATIVA CORRETA.</p> <p>d) devem-se manipular os medicamentos citostáticos sempre em capela de fluxo laminar horizontal, classe II, tipo B2 (com exaustão interna). ALTERNATIVA INCORRETA</p> <p>- Câmara Classe II, Tipo B2:</p> | | | |

*As câmaras Classe II, Tipo B2 são câmaras de exaustão total, muito utilizadas em laboratórios de toxicologia e aplicações semelhantes onde o efluente químico está presente e o ar limpo é essencial.

*Não há recirculação para a área de trabalho. O ar da sala entra através de um ventilador/ motor no cimo da câmara e passa através de um filtro HEPA de fornecimento para a área de trabalho com fluxo de ar vertical unidireccional. Portanto, câmaras (ou capela) Classe II, Tipo B2 possuem fluxo de ar vertical unidireccional e exaustão total e não vertical com exaustão interna como afirma a alternativa.

SUGIRO ALTERAÇÃO DO GABARITO DE (A) PARA (D).

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 15: Recurso procede. Alteração do gabarito para alternativa D.

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|---|--|---|--|
| 19 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: Solicito anulação da questão 19 acerca de nutrição parenteral, pois nenhuma das alternativas estava correta.</p> <p>Justificativa: As soluções de aminoácidos utilizadas em nutrição parenteral para pacientes com insuficiência renal variam na composição de acordo com o fabricante e nem sempre são compostas somente por aminoácidos classificados bioquimicamente como essenciais. Essa composição geralmente contém uma concentração menor de aminoácidos (7%) em relação as composições padrões para adulto (10%). Além de que, atualmente os termos essencial e não-essencial está em claro desuso, sendo substituído por condicionalmente essenciais para determinadas patologias ou situações, um exemplo dessa situação é o aminoácido histidina que de acordo com a classificação bioquímica é uma aminoácido essencial para crianças e não essencial para adultos, porém é considerado condicionalmente essencial para pacientes nefropatas.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 19: Mantem-se a alternativa E. A pergunta 19 remete-se a condição clínica que o indivíduo esta enfrentando. Considerando que a insuficiência renal aguda é uma dificuldade funcional que o sistema renal esta passando.</p> <p>Atualmente, é preferível o uso de aminoácidos essenciais na terapia nutricional de pacientes renais, uma vez que seu metabolismo gera menos ureia, tornando-se uma forma atrativa de suporte nutricional sem agravo da uremia. Assim, na essência a resposta correta é: aminoácidos essenciais.</p> <p>Bibliografia (s): Cano NJM, Aparicio M, Brunori G, Carrero JJ, Cianciaruso B, Fiaccadori E, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Adult Renal Failure. Clinical Nutrition. 2009;28(4): 401–414. Disponível em: http://www.espen.org/documents/0909/Adult%20Renal%20Failure.pdf. Acessado em: 06/12/2013.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 19: Recurso não procede. Manter a alternativa E.</p> | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 21 | <input type="checkbox"/> Manter a Questão | <input checked="" type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| RECURSO | 01: | Portaria | 344 |
| <p>c) a alternativa está realmente incorreta, pois o limite máximo são 3 substâncias da lista C1 e não 4 como afirma.</p> <p>e) primeiro afirma que a prescrição de retinóides de uso tópico (c2) de uso sistêmico são válidas em todo o território nacional e depois diz que são validas somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração, a questão está incorreta pois se contradiz em relação a validade da prescrição e não esclarece a forma de administração da substancia (uso tópico/ sistêmico).</p> <p>Questão 21, sobre a Portaria nº 344/1998 tinha a alternativa "E" que dizia o seguinte:</p> <p>"As prescrições de medicamentos retinóides de uso tópico (C2) de uso sistêmico são válidos em todo território nacional e devem ser de cor branca, com validade de 30 dias, contando a partir da data de emissão e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração."</p> <p>Assim, a afirmação fica contraditória, porque primeiro fala que a prescrição é válida em todo território nacional e no final diz que é válida somente dentro da unidade federada. O que torna a alternativa falsa.</p> <p>Como no enunciado da questão era para marcar a afirmação incorreta, estaria certo marcar duas respostas ("C" e "E").</p> <p>Obrigada sugiro ANULAÇÃO DA QUESTÃO PELA PRESENÇA DE 2 ALTERNATIVAS INCORRETAS.</p> | | | |
| RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 21: Recurso procede. Anular a questão. | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|---|--|---|--|
| 22 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: PORTARIA 344.</p> <p>Os medicamentos sujeitos a controle especial classificados na lista (B1 e B2) são considerados substancias psicotrópicas. ALTERNATIVA CORRETA</p> <p>- Por exemplo:</p> <p>Art. 11 A empresa importadora fica obrigada a solicitar à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a fixação de Cota Anual de Importação de substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C3" (imunossupressoras) e "D1" (precursoras) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, requeridas até 30 (trinta) de novembro de cada ano, para uso no ano seguinte.</p> <p>d) Os medicamentos que contêm misoprostol na fórmula são de venda e uso restrito ao hospital.</p> <p>- a portaria diz que "só será permitida a compra e uso do medicamento contendo a substância MISOPROSTOL em estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto a Autoridade Sanitária para este fim; e ainda art 25, "Parágrafo</p> | | | |

único. As vendas de medicamentos a base da substância Misoprostol constante da lista “C1” (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento Técnico, ficarão restritas a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto a Autoridade Sanitária competente. Ou seja, o uso é restrito ao hospital mas este não pode vendê-lo como dá a entender a alternativa. Os medicamentos contendo misoprostol só podem ser vendidos aos hospitais, ou seja só os hospitais podem comprar e não comercializar. SUGIRO: Alteração de gabarito de A para E, ou caso seja alegado que eu interpretei mau a questão sugiro anulação desta devido a falta de uma alternativa incorreta.

RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 22: Mantém-se a alternativa A. Pela portaria nº 344 os medicamentos classificados como “C3” são imunossupressoras e não imunodepressores, apresentam definições:

Define-se **IMUNODEPRESSÃO** como um estado de deficiência do sistema imunitário para, normalmente, responder aos agentes agressores. A imunodepressão pode ser primária e secundária ou adquirida. É primária quando dependente de fatores genéticos hereditários que afetam o processo de defesa imunológica, causando maior susceptibilidade às infecções, geralmente por germes de baixa patogenicidade, bem como às doenças autoimunes e às neoplasias. Na maior parte das vezes, manifesta-se na infância. A forma adquirida, como o próprio nome indica, deve-se a um fator externo que afeta o sistema imunológico e é exemplificada pela Síndrome de Imunodeficiência Adquirida causada pelo vírus HIV-1; apresenta igualmente grande susceptibilidade às infecções por germes oportunistas e ao aparecimento de neoplasias.

IMUNOSSUPRESSÃO é o ato de reduzir deliberadamente a atividade ou eficiência do sistema imunológico. A imunossupressão é feita, usualmente, para coibir a rejeição em transplantes de órgãos ou para o tratamento de doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatóide, esclerose sistêmica, doença inflamatória intestinal, entre outras. Para fazê-la, recorre-se normalmente a medicamentos. *Rezende, 2011.*

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 22: Recurso não procede. Manter a alternativa A.

| QUESTÃO | RESULTADO |
|---|---|
| 27 | (X) Manter a Questão () Anular a Questão () Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: interações farmacocinéticas</p> <p>a) Adsorção, quelação e outros mecanismos de complexação</p> <p>b) Ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima</p> <p>c) Interações de efeito ocorrem quando dois ou mais fármacos em uso concomitante têm ações farmacológicas similares ou opostas. Podem produzir sinergias ou antagonismos sem modificar farmacocinética ou mecanismo de ação dos fármacos envolvidos. Por exemplo, álcool reforça o efeito sedativo de hipnóticos e anti-histamínicos.</p> | |

| |
|---|
| <p>- As três alternativas estão corretas e são relacionadas a farmacocinética</p> <p>d) alterações organolépticas</p> <p>e) formação de novo composto (ativo, inócuo, tóxico)</p> <p>- São relacionadas a farmacodinâmica</p> <p>SUGIRO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR HAVER MAIS DE UMA ALTERNATIVA QUE PODEM SER DITAS CORRETAS E RELACIONADAS COM FARMACOCINÉTICA.</p> |
| <p>RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 27: Mantem-se a Alternativa A, pois as alternativas B, C e E estão relacionadas com interações Farmacodinâmicas e a alternativa D com Incompatibilidade de medicamentos.</p> |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 27: Recurso não procede. Manter a alternativa A.</p> |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|--|---|---|---|
| 39 | <input type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input checked="" type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| RECURSO | <p>01: Fármacos antituberculose.</p> <p>A observação da proporcionalidade direta de populações bacilares persistentes a morbidade da doença com a população bacilar total deram origem ao princípio do tratamento bifásico. Esse possui uma fase chamada inicial ou de ataque, objetivando a rápida redução da carga bacteriana evitando a resistência, e a segunda é de manutenção, impedindo a reativação da doença ou recidivas, com a esterilização dos resistentes (DALCOMO et AL., 2007).</p> <p>A divisão nacional de pneumologia sanitária, através do programa nacional de controle da tuberculose, preconiza o tratamento das formas ativas de TB, exceto meningite, feito sempre com o Esquema I (rifampicina, isoniazida e pirazinamida), na fase inicial (dois meses) seguida da fase de manutenção (4 meses) com rifampicina e isoniazida. Sendo este esquema recomendado para pacientes que nunca fizeram tratamento para TB ou realizaram-no por apenas 30 dias (BRASIL,2002).</p> <p>SUGIRO ALTERAÇÃO DO GABARITO DE (D) PARA (E), pois a alternativa D inverte a duração das fases tornando a questão incorreta.</p> | | |
| RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 39: Recurso procede. Alteração do gabarito para alternativa E. | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|----------------|---|---|--|
| 40 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| RECURSO | <p>01: Farmacologia dos antibacterianos:</p> <p>A e E (alternativas iguais): todos são antibióticos B-lactâmicos que inibem a síntese da parede celular (penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, carbapenems e monobactams).</p> <p>ALTERNATIVAS CORRETAS</p> <p>B) ALTERNATIVA CORRETA.</p> | | |

SUGIRO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO DEVIDO A PRESENÇA DE PELO MENOS 3 ALTERNATIVAS CORRETAS (a, b, e).

As respostas iguais não comprometem a alternativa a ser assinalada como correta, portanto, mantém-se o gabarito, alternativa B. **RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 40: Recurso não procede. Manter a alternativa B.**

2. ANÁLISES CLÍNICAS

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|--|--|---|--|
| 06 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: 1 - Pela análise da referida questão, creio que há duas alternativas incorretas a primeira seria a letra A e a segunda questão incorreta seria a letra D, pois a toxoplasmose, no início da gestação apresenta uma menor probabilidade de transmissão, onde esta ocorre principalmente a partir do terceiro trimestre de gestação. Na referida questão consta que nas fases iniciais da doença é mais facilmente transmitida, sem especificar qual o período gestacional.</p> <p>2 - Gostaria de esclarecer também uma dúvida em relação ao item 7.11 do edital em que trata das condições para a realização das provas. Este item afirma que o candidato poderia levar ao término da prova o caderno de provas e sem as questões para análise fica muito difícil interpor recursos.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 06: Manter a questão – Justicativa: A alternativa D está correta. A interpretação do texto da alternativa está equivocado, pois o foco principal é o comprometimento fetal decorrente da doença. o que o texto diz é claro: “o risco de <u>comprometimento fetal</u> decorrente da transmissão congênita ocorre principalmente durante o início da gestação e com gestantes em primeira infecção”. Este conhecimento é sólido para esta doença. O contexto da alternativa não gira apenas em probabilidade de infecção. A Coordenação por meio de telefone esclareceu sobre a possibilidade do candidato levar ao término da prova o caderno das questões.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 06: Recurso não procede. Manter a alternativa A.</p> | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|--|--|---|--|
| 07 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: pela análise da prova verifiquei que a questão número 7 apresenta duas alternativas incorretas, onde a letra E afirma que os cilindros são os únicos elementos encontrados no sedimento urinário, sendo exclusivos dos rins.. Sabemos que não são os únicos, pois no sedimento também são encontrados cristais e outros elementos.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 07: Manter a questão – Justificativa: A questão está correta, portanto o gabarito continua com a mesma alternativa. Cabe ao recorrente a correta e atenciosa leitura dos termos utilizados na alternativa " E", conforme transcrição final da questão abaixo:</p> | | | |

- (...) os cilindros são os únicos elementos encontrados no sedimento urinário, ***sendo exclusivos dos rins..*** Vide grifo em negrito e itálico.

Todas as literaturas e artigos científicos descrevem que cilindros são os únicos elementos do sedimento urinário que são exclusivos dos rins, porque são formados no interior da luz dos túbulos contorcidos, principalmente o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, o que possibilita a visão microscópica das condições existentes no interior dos néfrons. Como o caso de cristais que a candidata citou, são formados pela precipitação dos sais na urina, em condições de alterações de pH, temperatura ou concentração o que afeta a sua solubilidade.

RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 07: Recurso não procede. Manter a alternativa C.

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|---|--|---|--|
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| RECURSO 01: ANULAR QUESTÃO 10. HÁ DUAS ALTERNATIVAS INCORRETAS - LETRA D E LETRA E. | | | |
| <p>Segundo artigo: Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care, ESC report.p.4, 2010. Assay Interferences: Most assay systems contain blocking antibodies to avoid these interferences but at times, antibody titres may be sufficiently high that they are not totally inhibited. Icteric, lipaemic, and haemolysed samples can also be a problem depending on the assay design. Accordingly, the lack of interferences in an assay system should be carefully documented. Interfering substances in general cause two types of patterns. The first is where the values are elevated and remain so chronically. Dilution of the samples often fail to cause changes in values until the interference (most often crossreacting antibodies or antibodies to either the immunoglobulin used to make the assay antibodies or other constituents in the assay) is gone at which time, the values become markedly reduced. This artefact can be unmasked as well—if heterophilic antibodies are the cause—by the administration of additional blocking antibodies in heterophilic blocking tubes.</p> | | | |
| RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 10: Manter a questão – Justificativa: | | | |
| <p>De acordo com a própria literatura apresentada pelo recorrente, a questão está correta, não cabendo neste caso anulação da mesma. Cabe ao recorrente a correta e atenciosa leitura dos termos utilizados na alternativa " E" o que constata que a mesma apresenta-se correta, conforme transcrição final da questão abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (...) Amostras ictéricas, lipêmicas e hemolisadas também podem ser um problema, essas interferências <i>podem tentar ser</i> eliminadas com diluições. Vide grifo em negrito e itálico. | | | |
| RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 10: Recurso não procede. Manter a alternativa D. | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|---|--|---|--|
| 20 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: ANULAR QUESTÃO 20, 2 ALTERNATIVAS CORRETAS. ÍNDICE TERAPÊUTICO - MARGEM DE SEGURANÇA Segundo a Bibliografia Seizi Oga (1.3), Toxicocinâmica, pag 1. ...Esses valores são frequentemente utilizados (DL50, DE, DL90), para expressar a eficácia dos medicamentos e sua correlação com as doses letais permite identificar os índices chamados ÍNDICE TERAPÊUTICO (IT) e MARGEM DE SEGURANÇA (MS).....</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 20: Manter a questão – Justificativa: refere-se apenas ao termo DOSE LETAL 50. No texto citado pelo candidato, vários termos são colocados de maneira geral e, não apenas DL50.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 20: Recurso não procede. Manter a alternativa D.</p> | | | |

| QUESTÃO | RESULTADO | | |
|--|--|---|--|
| 21 | <input checked="" type="checkbox"/> Manter a Questão | <input type="checkbox"/> Anular a Questão | <input type="checkbox"/> Mudar a Questão |
| <p>RECURSO 01: Anular questão 21. Mesmo havendo sazonalidade para prevalência de certos tipos de fungos, somente por aspectos climáticos, por exemplo, não se identifica uma doença porque faltam caracteres clínicos dentre outros parâmetros para que se tenha uma classificação correta desta.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AOS RECURSOS DA QUESTÃO 21: Manter a questão – Justificativa: não se refere à identificação de doença fúngica e sim ao aspecto ecológico para isolamento do agente etiológico levando em consideração apenas algumas características (Regiões quentes com invernos amenos e solo levemente alcalino com altas concentrações de sal). As características são, inclusive, típicas de algumas áreas da região Nordeste do Brasil de onde se propícia o isolamento do <i>Coccidioides immitis</i> causador da <i>Coccidioidomicose</i>.</p> | | | |
| <p>RESPOSTA AO RECURSO DA QUESTÃO 21: Recurso não procede. Manter a alternativa D.</p> | | | |