



Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84

Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 - Fax: (45) 3324-4590

Jardim Universitário - Cx. P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

www.unioestg.br

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

EDITAL Nº 025/2017-CPS/COREME

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA PARA A TERCEIRA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA UNIOESTE, PARA O ANO LETIVO DE 2017.

O Coordenador do Programa de Residência Médica do **HUOP** (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das atribuições estatutárias e regimentais e considerando:

- o Edital nº 006/2017-CPS/COREME, de 10 de fevereiro de 2017.

TORNA PÚBLICO:

1.1 As respostas aos recursos contra o gabarito provisório da **Prova Objetiva** para a terceira seleção de candidatos ao Programa de Residência Médica (doravante, **Programa**) da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

ANÁLISE DOS RECURSOS DA PROVA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM DERMATOLOGIA

QUESTÃO:	RESULTADO:		
17	<input type="checkbox"/> Manter a Questão	<input checked="" type="checkbox"/> Anular a Questão	<input type="checkbox"/> Mudar a Alternativa
RECURSO 01 - Sabemos que a dose de lidocaína sem vasoconstritor é de 3 a 5 mg/kg. Quando utilizamos vasoconstritor, diminuimos a toxicidade, portanto, a dose máxima recomendada é de 7 a 8 mg/kg. A dose recomendada encontra-se descrita em anexo na Tabela 14-8, presente no capítulo 14 (CHAPTER 14 Anesthesiology Principles, Pain management and Conscious Sedation), pag 380, do livro texto Sabiston Textbook of Surgery, 19ª edition. Lidocaína a 2% significa 2 g em 100 ml, o que é o mesmo que 2.000 mg em 100 ml ou 20 mg/ml Se utilizarmos a lidocaína com vasoconstritor, na dose de 7 mg/kg teremos 7 mg x 90 kg = 630 mg Em uma simples regra de três: em 1 ml temos 20 mg, logo 630 mg corresponderá a 31,5 ml; Se utilizarmos a dose de 8 mg/kg, teremos 8 mg x 90 kg = 720 mg; Em uma simples regra de três: em 1 ml temos 20 mg, logo 720 mg corresponderá a 36 ml. Sendo assim, concluímos que a dose a ser empregada irá variar de 31,5 ml a 36 ml. Dessa forma, por não existir alternativa compatível, venho a solicitar a anulação da questão.			

RECURSO 02 - A questão a respeito de drogas anestésicas locais se refere a lidocaína com vasoconstritor a 2%, solicitando o máximo em ml que pode ser administrada no paciente com 90kg. Segundo o Tratado de Cirurgia - Sabiston, 18 Edição, capítulo 18, página 423, tabela 18-7, a lidocaína possui como dose máxima de 5mg/kg sem epinefrina. No entanto, como referente a questão, a dose pode ser aumentada a 7-8mg/kg quando adicionada epinefrina. Assim sendo, um paciente de 90kg poderá receber 630mg até 720mg. Conclui-se então, que poderá receber 31,5 a 36ml. Como a resposta mais aproximada é a letra E com 30ml, solicito a alteração do gabarito desta questão. Exames apresentados pelo paciente não são critérios de gravidade, amilase Adultos 20-160 U / L (método forte / laboratório dependente, lipase até 60, leucócitos 4000 a 12000, bastões 1 a 4%, proteína C reativa até 6, enfim não fatores de risco, agora paciente interna por dor abdominal com foco definido e não se drena essas coleções.

RESPOSTA AO RECURSO: Anular a questão.

QUESTÃO:	RESULTADO:		
32	<input type="checkbox"/> Manter a Questão	<input checked="" type="checkbox"/> Anular a Questão	<input type="checkbox"/> Mudar a Alternativa

RECURSO 01 - A questão referente as manifestações clínicas e laboratoriais que podem ser encontradas no paciente com Anemia Falciforme solicita a com maior probabilidade de ser encontrada. Segundo o Tratado de Hematologia de Zago, M.A. et al, capítulo 27, a síndrome de sequestro esplênico se caracteriza por esplenomegalia que pode ser encontrada nos primeiros anos de vida. Já a infecção osteomielite por Salmonella não é rara de ocorrer, porém pode ser causada por demais microorganismos como S.aureus. Portanto, solicito a alteração do gabarito para a letra A.

RESPOSTA AO RECURSO: Anular a questão.

QUESTÃO:	RESULTADO:		
42	<input type="checkbox"/> Manter a Questão	<input checked="" type="checkbox"/> Anular a Questão	<input type="checkbox"/> Mudar a Alternativa

RECURSO 01 - Prezada banca examinadora, de acordo com o livro-texto Rezende Obstetrícia 12ª edição, capítulo 76, página 877, a categoria B do FDA é classificada como "Medicamentos para os quais estudos na reprodução animal não demonstraram risco fetal, mas não há estudos controlados no ser humano". Considerando que os estudos de segurança em animais não garantem a mesma segurança em humanos, a categoria B inclui medicações que, apesar de não apresentarem evidências positivas de malformações associadas, os riscos não podem ser afastados devido à falta de estudos em gestantes. Solicito a anulação da questão pois tanto a letra C quanto a letra B podem ser interpretadas como dentro da categoria B do FDA.

RESPOSTA AO RECURSO: Anular a questão.

QUESTÃO:	RESULTADO:		
84	<input type="checkbox"/> Manter a Questão	<input checked="" type="checkbox"/> Anular a Questão	<input type="checkbox"/> Mudar a Alternativa
RECURSO 01 - A questão apresenta duas possíveis respostas corretas. Na epidemia progressiva, há a existência de transmissão direta de pessoa-pessoa e indireta por vetor. Considerando esses dados presentes no GUIA PRÁTICO DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE SURTOS DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS do MS, solicito a alteração do gabarito, com duas respostas corretas C e D.			
RESPOSTA AO RECURSO: Anular a questão.			

Publique-se e cumpra-se.

Cascavel, 06 de março de 2017.

ANDRÉ PEREIRA WESTPHALEN
Coordenador da Comissão de Residência Médica

IONARA DINIZ EVANGELISTA SANTOS BARCELOS
Presidente da Comissão do Processo Seletivo